

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 8 del 05.07.2010

Fase fenologica prevalente: Prechiusura grappolo

FLAVESCENZA DORATA

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l'obbligo di effettuare un trattamento contro il vettore della malattia

entro i primi giorni della settimana

con **Tiametoxam (Actara) alla dose di 200 gr/Ha**

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla distribuzione utilizzando alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate ed irrorando entrambe le parti del filare.

Le aziende che aderiscono a regolamenti di lotta biologica devono intervenire **immediatamente** solo ed esclusivamente con **Piretro naturale** eventualmente addizionato di Piperonil butossido trattando nelle ore crepuscolari e ripetendo lo stesso intervento a distanza di 8-10 giorni.

Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio lo sfalcio della vegetazione sottostante in caso di fioriture spontanee evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

PERONOSPORA

In considerazione della delicata fase di recettività della vegetazione ed essendo ormai trascorsi diversi giorni dall'ultimo trattamento, si consiglia di aggiungere alla miscela insetticida uno dei seguenti prodotti antiperonosporici:

Zoxamide + Rame

Mandipropamid + Rame

Fenamidone + Rame

Si ricorda che le norme tecniche della misura 214.1 prevedono che i formulati contenenti Mandipropamid, Dimetomorf e Iprovalicarb debbano essere complessivamente utilizzati per un numero di interventi non superiori a quattro.

OIDIO

L'attuale campagna risulta estremamente difficile per il contenimento di questa malattia. Si consiglia quindi di mantenere sempre protetta la vegetazione con principi attivi preventivi. Ove la situazione sanitaria risulti ottimale, si consiglia di unire alla miscela un formulato a base di Quinoxifen, Metrafenone o Trifloxistrobin.

Chi ne avesse la possibilità può, in alternativa, intervenire in seguito con zolfo in polvere.

"Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui territori a vigneto dei **Comuni aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole dell'area Casalese** e ne è vietata la diffusione in altri Comuni non convenzionati.

Il Comitato di coordinamento fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non autorizzata delle presenti informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati."

Coldiretti Casale M.to 0142 452840

Coldiretti Cerrina 0142 943800

Confagricoltura Alessandria 0142 452209

Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617

I.T.A. Rosignano M.to 0142 488151